

dosalid™

1200 mg



ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

DOSALID tabs 1200 mg.

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ (Α)

Δραστικό(ά) συστατικό(ά):

Κάθε δισκίο των 1200mg περιέχει 100mg Epsiprantel και 90.80 mg Pyrantel (ως Pyrantel Pamoate 261.60mg)

Έκδοχα:

STARCH MAIZE PREGELATINISED	48 mg
SODIUM LAURYL SULPHATE	3.60 mg
SILICON DIOXIDE COLLOIDAL	9.60 mg
STARCH MAIZE	60 mg
CELLULOSE MICROCRYSTALLINE	240 mg
MAGNESIUM STEARATE	7.20 mg
LACTOSE MONOHYDRATE	470 mg

3. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Δικαιούχος: Pfizer Inc,NY,USA.

ΚΑΚ σε Ελλάδα και Κύπρο: ZOETIS HELLAS SA, Λ. Μεσογείων 253-255, Ν. Ψυχικό, Αθήνα,

τηλ: 210 6785800, ΑΜΚ: 34512

Τοπικός διανομέας στην Κύπρο: VitaTrace Nutrition Ltd, 2033, Στρόβολος, τηλ: 22 426527 ΑΑΚ: CY00007V

Παρασκευαστής: FARMASIERRA SPAIN

4. ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)

Σκύλος

5.ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)

Το Dosalid είναι ένα ευρέως φάσματος ανθελμινθικό για την καταπολέμηση των κεστωδών και των νηματωδών παρασίτων του σκύλου. Έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικό εναντίον των παρακάτω ενήλικων παρασίτων.

Κεστώδη: *Dipylidium caninum*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis* και *Echinococcus granulosus*

Νηματώδη

Ασκαρίδες: *Toxocara canis* και *Toxascaris leonina*.

Αγκυλοστόματα: *Uncinaria stenocephala* και *Ancylostoma caninum*.

Το Dosalid μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία των παρασιτώσεων.

6. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 10,5mg/kg των συνδυασμένων δραστικών συστατικών(5,5 mg/kg εψιπραντέλης και 5mg/kg πυραντέλης).Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός.

Σωμ. Βάρος	Αρ. δισκίων ανά χορήγηση	
	300mg	1200mg
1 - 2	1/2	-
3 - 4	1	-
5 - 6	1 1/2	-
7 - 9	2	1/2
10 - 13	3	1
14 - 18	4	1
19 - 27	-	1 1/2
28 - 36	-	2
37 - 46	-	3
πάνω από 47	-	4

Κουτάβια

Το Dosalid χορηγείται στα κουτάβια στην ηλικία των 2-4 εβδομάδων και κατόπιν κάθε μήνα μέχρι την ηλικία των 6 μηνών. Σε περιπτώσεις έντονου παρασιτισμού από *T.canis* πιθανόν να είναι απαραίτητη η συνεχόμενη χορήγηση για 2-3 ημέρες

Ενήλικα ζώα

Κάθε 6 μήνες, ή εάν κρίνεται απαραίτητο πιο συχνά για τον έλεγχο των ταινιών(κάθε μήνα).

Σε περιπτώσεις παρασιτισμού από εχινόκοκκο και λόγω της μεγάλης σημασίας του παρασίτου αυτού για την δημόσια υγεία συστήνεται η επανάληψη της θεραπείας μία εβδομάδα αργότερα και στην ίδια δοσολογία.

Θηλυκά ζώα κατά την περίοδο θηλασμού.

Χορηγείται στην αρχή της περιόδου θηλασμού.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το Dosalid χορηγείται μόνο από το στόμα στους σκύλους.

Δεν χρειάζεται νηστεία πριν από την χορήγηση

8.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αποφυγή των αναμολύνσεων Για τον λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, να καταπολεμούνται οι ενδιάμεσοι ξενιστές(π.χ. ψύλλοι) και να αποφεύγεται η χορήγηση στα ζώα ωμής τροφής.

9. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν υπάρχουν γνωστές

10.ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν υπάρχουν γνωστές

11. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται

12.ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες.

13. ΕΙΔΙΚΗ (ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣ)

Καμία

14.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΠΟΡΙΨΗ ΤΟΥ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δεν εφαρμόζεται

14.ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν υπάρχουν

Να φυλάγεται μακριά από τα παιδιά.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777