

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

LincoSpectin Sterile

Στείρο ενέσιμο διάλυμα λινκομυκίνης και σπεκτινομυκίνης για
Χοίρους, Νεαρά μοσχάρια, Πρόβατα, Αίγες, Όρνιθες, Ινδιάνους, Σκύλους και Γάτες

**ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

ZOETIS HELLAS S.A

Μεσογείων 253-255

Ν. Ψυχικό 154 51

Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +302106791900

Fax.: +30 210 6748010

E-mail: info@zoetis.com

ΑΑΚ: Κ-0015804/ 9777/16-03-1995

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain -la-Neuve, Belgium

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε 1 ml διαλύματος περιέχει:

Δραστικές ουσίες:

Lincomycin hydrochloride (as Lincomycin base) 50 mg

Spectinomycin sulphate (as Spectinomycin base) 100 mg

Έκδοχα: Benzyl Alcohol, Water for injection

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για τη θεραπεία γενικευμένων και εντοπισμένων λοιμώξεων των σκύλων, γάτων, χοίρων, νεαρών μοσχარიών, προβάτων, αιγών, ορνίθων και ινδιάνων που οφείλονται σε στελέχη μικροοργανισμών ευαίσθητων στη LINCO-SPECTIN.

Σκύλοι:

Λοιμώξεις του αναπνευστικού, του ουρογεννητικού και του δέρματος. Δευτερογενείς μικροβιακές επιπλοκές, επακόλουθο διαφόρων ιώσεων.

Γάτες:

Λοιμώξεις των ανωτέρων αναπνευστικών οδών, του ουροποιητικού, επιμολυσμένα τραύματα, αποστήματα. Δευτερογενείς μικροβιακές επιπλοκές διαφόρων ιώσεων.

Χοίροι:

Βακτηριακή και μυκοπλασματική πνευμονία, δυσεντερία των χοίρων, βακτηριακή εντερίτιδα, λοιμώδης αρθρίτιδα.

Νεαρά μοσχάρια:

Επιπλέκοντες την ιογενή πνευμονοεντερίτιδα μικροοργανισμοί.

Αίγες-Πρόβατα:

Λοιμώδης ποδοδερματίτιδα. Αναπνευστικές λοιμώξεις που οφείλονται σε μυκόπλασμα και GRAM+βακτηρίδια.

Όρνιθες και ινδιάνοι:

Λοιμώξεις που οφείλονται σε μυκόπλασμα με ή χωρίς επιπλοκή *E. Coli* σε συνδυασμό με Χ.Α.Ν. (αεροθυλακίτιδα), χολέρα πτηνών και λοιμώξεις Arizona.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν χορηγείται σε ωοτόκες όρνιθες.

Αντενδείκνυται η χορήγηση του LINCO-SPECTIN σε ζώα ή πτηνά ευαίσθητα στη λινκομυκίνη ή τη σπεκτινομυκίνη.

Η λινκομυκίνη είναι τοξική για τους λαγούς, ινδόχοιρους και chinchillas.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Γενικά δεν παρατηρούνται παρενέργειες.

Η χορήγηση Lincospectin σε χοίρους και σε δόσεις υψηλότερες από αυτές που συνιστούνται, ενδέχεται να προκαλέσει παροδική διάρροια ή υδαρή κόπρανα.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)
- μη συνηθισμένη ((περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα)

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Χοίροι, Νεαρά μοσχάρια, Πρόβατα, Αίγες, Όρνιθες, Ινδιάνοι, Σκύλοι και Γάτες

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σκύλοι: 1 ml / 5 kg Σ.Β. ενδομυϊκά την ημέρα και μέχρι 21 ημέρες.

Γάτες: 1 ml / 5 kg Σ.Β. μια ή δύο φορές την ημέρα και μέχρι 21 ημέρες.

Χοίροι: 1 ml / 10 kg Σ.Β. μια φορά την ημέρα για 3-7 ημέρες.

Νεαρά μοσχάρια: 1 ml / 10 kg Σ.Β. ενδομυϊκά δύο φορές την πρώτη ημέρα και συνεχίζεται μία φορά την ημέρα για 2-4 ημέρες (το μέγιστο για 3 ημέρες).

Αίγες-Πρόβατα: 1 ml / 10 kg Σ.Β. ενδομυϊκά μία φορά την ημέρα για 3 ημέρες (το μέγιστο για 3 ημέρες).

Όρνιθες-Ινδιάνοι: 0,1 ml / 0,5 kg Σ.Β. υποδόρια μία φορά την ημέρα για 3 ημέρες, ή κάνουμε έγχυση μία φορά και συνεχίζουμε για 3 – 5 ημέρες με χορήγηση υδατικού διαλύματος LINCO-SPECTIN Soluble Powder.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Να μην υπερβαίνεται ο χρόνος χορήγησης διότι προκαλεί σοβαρά προβλήματα στα μηρυκαστικά.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Αίγες:	Κρέας	14 ημέρες
	Προϊόν	2 ημέρες
Βοοειδή:	Κρέας	14 ημέρες
	Προϊόν	2 ημέρες
Πρόβατα:	Κρέας	14 ημέρες
	Προϊόν	2 ημέρες
Πουλερικά:	Κρέας	14 ημέρες
Χοίροι:	Κρέας	14 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Καμία

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων.
Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συσκευασίες:

Κουτιά με φιαλίδια των 20 ml, 50 ml και 100 ml

Φιάλες των 250 ml και 500 ml

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν,
παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου

**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ**

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 7793 777