

Banminth

στοματική πάστα για σκύλους 21,62 mg/gr



1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας σε Ελλάδα και Κύπρο:

Zoetis Hellas S.A

Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι

15125, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +302106791900

Φαξ: + 30 210 6748010

E-mail: infogr@zoetis.com

Τοπικός διανομέας στην Κύπρο:

VitaTrace Nutrition Ltd

2033, Στρόβολος,

Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +357 22 426527

Φαξ: +3572249835

E-mail: reception@vitatrace.com

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ: 83108/25-11-2011

ΚΥΠΡΟΣ: 14152

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

Zoetis Belgium SA, LLN, Belgium.

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Banminth, στοματική πάστα ανοικτού κίτρινου χρώματος για σκύλους

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε 1g του προϊόντος περιέχει:

Δραστικό(ά) συστατικό(ά):

Pyrantel Pamoate 21, 62 mg

(αντιστοιχεί με 7, 5 mg Pyrantel base)

Εκδόχα:

Sodium Alginate

Sorbitol Solution 70%

Silicon Dioxide Colloidal

Methylparaben

Propylparaben

Purified Water

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το Banminth πάστα για σκύλους ενδείκνυται για τον έλεγχο και την θεραπεία παρασιτώσεων που οφείλονται σε

νηματώδεις σκώληκες του γαστρεντερικού σωλήνα του σκύλου. Το Banminth είναι ιδιαίτερα δραστικό εναντίον των

παρακάτων παρασίτων του σκύλου.

-*Toxocara canis*.

-*Toxascaris leonina*

-*Uncinaria stenocephala*

-*Ancylostoma caninum*

-*Ancylostoma braziliensis*

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν αναφέρεται καμία αντένδειξη, εφ όσον τηρούνται οι συνθήκες καλής φύλαξης και δοσολογίας.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν αναφέρονται

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)

- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα)

- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα)

- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα)

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών

χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΣΩΩΝ

Σκύλοι

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ (ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το Banminth πάστα για σκύλους μπορεί να χορηγηθεί είτε απευθείας στο στόμα με την βοήθεια μιας σπάτουλας είτε

μετά από ανάμειξη με την τροφή. Το Banminth χορηγείται στη δόση 2 cm πάστας ανά kg σ.β. Κάθε cm πάστας περιέχει

7.2mg Pyrantel Pamoate (2.5mg Pyrantel base). Κάθε σωληνάριο 24g επαρκεί για 36 kg σ.β.

Δοσολογικό σχήμα

Προβείτε σε προγραμματισμένες δόσεις στις πιο κάτω φάσεις της ζωής του σκύλου.

Προληπτική αγωγή:

Κουτάβια που θηλάζουν: Πρώτη δόση σε ηλικία 2 εβδομάδων της ζωής τους επαναλαμβανόμενη κάθε

2 εβδομάδες μέχρι τον απογαλακτισμό. Μετά την περίοδο απογαλακτισμού, θα πρέπει η χορήγηση να γίνεται ανά

3 μήνες.

40025140

Σε κουτάβια που απομακρύνονται από την μητέρα και δεν έχει εφαρμοστεί το ανωτέρω πρόγραμμα προτείνεται η

άμεση χορήγηση μιας δόσης με δύο επαναλήψεις σε μεσοδιάστημα 10 ημερών.

Όταν υπάρχει κουτάβι που προέρχεται από μια τοκετοσομάδα, στην οποία δεν έχει ακολουθηθεί το πρόγραμμα

ρουτίνας που προτείνεται για τα κουτάβια, συνιστάται το ακόλουθο πρόγραμμα: Μία δόση την ημέρα της άφιξης, μία

την 10^η ημέρα και μία την 20^η ημέρα μετά την άφιξη. Μετά ακολουθείτε, το πρόγραμμα που ενδείκνυται για τα

κουτάβια.

Θηλυκοί σκύλοι:

- Σκύλοι που εγκυμονούν: Μία δόση στο μέσο της εγκυμοσύνης (περίπου την 30^η μέρα της κυοφορίας)

- Σκύλοι σε γαλουχία: 2 εβδομάδες μετά τον τοκετό και μετά κάθε 2 εβδομάδες μέχρι τον απογαλακτισμό των

κουταβιών. Συνιστώνται η χορήγηση στη μητέρα και τα κουτάβια που θηλάζουν να γίνεται ταυτόχρονα.

Ενήλικοι σκύλοι: από την ηλικία των 6 μηνών μία χορήγηση ανά 3 μήνες.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Προς διευκόλυνσή σας, χρησιμοποιήστε τον μετρητή πάνω στο κουτί της συσκευασίας.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25° C.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Καμία

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:

Καμία.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε

ζώα:

- Αποφύγετε την επαφή του φαρμάκου με το δέρμα.

- Πλύνετε καλά τα χέρια σας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος που ήρθε σε επαφή με το φάρμακο.

- Να φυλάγεται μακριά από τα παιδιά.

- Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση ή επαφή με το δέρμα, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και

να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.

Εγκυμοσύνη, Γαλουχία:

Το Banminth πάστα για σκύλους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και γαλουχίας.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:

Δεν είναι γνωστή καμία.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντιδοτα):

Το Banminth πάστα για σκύλους, έχει ευρύτητα περιθώρια ασφαλείας για όλες τις ηλικίες, υπερλαμβανομένων και

των μικρών σκύλων.

Ασυμβατότητες:

Δεν ισχύει.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά

αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

25/11/2011

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η πυραντέλη είναι μία ευρέως φάσματος ανθελμινθική ουσία της οικογένειας των τετραυδροπυριμιδινών η οποία είναι

δραστική εναντίον των κυριότερων γαστρεντερικών ημιατελμίνθων του σκύλου και της γάτας.

Η πυραντέλη δρα στις νευρομυϊκές συνάψεις των μύϊκών κυττάρων των παρασίτων, προκαλώντας τη σπαστική

παράλυσή τους, την αποβολή τους από το ξενιστή και τελικά το θάνατό τους.

Η παμοϊκή πυραντέλη είναι δυσδιάλυτη στο νερό και δεν απορροφάται εύκολα με αποτέλεσμα να δρά στα παράσιτα

του τελικού τμήματος του παχέος εντέρου, αναλκίοιτη.

Κανονικά δοσολογικά σχήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για ένα σημαντικό αντιπαρασιτικό έλεγχο.

Παρατεταμένες χορηγήσεις είναι δυνατόν να δημιουργήσουν ανθεκτικά στελέχη παρασίτων έναντι της δραστικής

ουσίας.

Συσκευασία:

Κουτί που περιέχει σωληνάριο των 24 gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε

στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 7793 777

zoetis

40025140