

zoetis

Vanguard[®] CPV



Ενέσιμο διάλυμα που περιέχει τον παρβοϊό σκύλου

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Zoetis Hellas S.A,
Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι
15125, Αττική, Ελλάδα
Τηλ: +302106791900
Fax.: +30 210 6748010
E-mail: info@zoetis.com
AAK: 44232/17-11-1995

Τοπικός διανομέας στην Κύπρο

VitaTrace Nutrition Ltd,
2033, Στρόβολος,
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22 426527
FAX: +3572249835
E-mail: reception@vitatrace.com
AAK: 16339

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση της παρτίδας

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
ΒΕΛΓΙΟ

2. ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε μία δόση 1 ml περιέχει:

Δραστικές ουσίες	Ποσότητα
Canine Parvovirus, NL – 35 D	
Live modified	> 10 ⁷ TCID ₅₀

Εκδόχα
Neomycin sulfate
Gentamycin sulfate
Water for injection

3. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Κυνάρια και σκύλοι από την ηλικία των 5 βδομάδων.

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για την ενεργητική ανοσοποίηση των σκύλων και την πρόληψη της θνησιμότητας και των κλινικών συμπτωμάτων, που περιλαμβάνουν λευκοπενία, καθώς και την μείωση της διασποράς το ιού, που προκαλείται από το canine parvovirus (τύποι 2a, 2b και 2c).

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το εμβόλιο προορίζεται για χρήση μόνο σε σκύλους. Όπως συμβαίνει και με κάθε άλλο εμβόλιο, αντενδείκνυται για ένα μήνα μετά τη χορήγηση υπεράνοσου ορού φαρμάκων που προκαλούν ανοσοκαταστολή, η χορήγηση του VANGUARD CPV. Συνιστάται όπως μη χορηγείται σε έγκυα ζώα ή ζώα που δεν είναι υγιή. Μη χρησιμοποιείτε σύριγγες ή βελόνες που έχουν αποστειρωθεί με χημικές μεθόδους.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ σπάνιες και δεν συνιστάται κάποια συγκεκριμένη θεραπεία, εάν εμφανισθούν τέτοιες. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, εμφανισθεί αλλεργική αντίδραση χορηγείστε αδρεναλίνη. Το VANGUARD CPV περιέχει ίχνη αντιβιοτικού. Είναι δυνατόν, σε οποιαδήποτε εκτροπή ζώων, ορισμένα από αυτά να μην αντιδράσουν στον εμβολιασμό.

7. ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ανακινείτε καλά το φιαλίδιο και χορηγείτε αμέσως όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου (1 ml) υποδόρια. Με το VANGUARD CPV μπορούν να εμβολιάζονται νεαροί σκύλοι από την ηλικία των 5 βδομάδων. Όταν οι σκύλοι που πρωτοεμβολιάζονται έχουν ηλικία μικρότερη των 12 βδομάδων πρέπει να επαναεμβολιάζονται κάθε 2 – 3 εβδομάδες έως την ηλικία των 18 – 22 εβδομάδων. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η πιθανότητα εξουδετέρωσης των εμβολιακών αντιγόνων από τα υπάρχοντα μητρικά αντισώματα.

Μία μόνο δόση του VANGUARD CPV είναι αρκετή για την πλήρη ανοσοποίηση σκύλων μεγαλύτερων των 22 βδομάδων. Συνιστάται ο επαναληπτικός εμβολιασμός κάθε χρόνο.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται.

9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία +2° C - +8° C προστατευμένο από το φώς.
Να μην καταψύχεται.

10. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Δεν πρέπει να εμβολιάζονται ασθενή και έγκυα ζώα.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμμάτα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

12. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί που περιέχει 25 φιαλίδια της 1 δόσης VANGUARD CPV .

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου

**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 7793 777**